



Généralités concernant l'écrasement des comprimés ou l'ouverture des gélules

Réf. : GQ.FIC.2014.144.

Page : 1 / 2

Application : 06 /10 /2016

Version	Nature de la modification	Date d'application
1	Création	02 /12 /2014
2	Modification	06 /10 /2016

COUPER, ECRASER OUVRIR, QUELS SONT LES RISQUES POTENTIELS ?

- ⇒ **Erreur de dosage**, sur ou sous dosage
- ⇒ **Toxicité locale** avec irritation ou ulcération des muqueuses
- ⇒ Modification des propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques ou pharmacologiques engendrant une **toxicité, ou une perte d'effet**

REGLES GENERALES

- ⇒ En l'absence de barre de sécabilité sur un comprimé, la division est aléatoire et devrait être évitée
Il est préférable d'utiliser un autre dosage, une autre forme ou spécialité
- ⇒ Il ne faut pas couper, écraser, ouvrir les formes orales :
 - √ Gastro-résistantes (sauf pour les sondes jéjunales)
 - √ A libération modifiée (retard, LP, LM, Oros,...), les gélules LP peuvent être ouvertes mais leur contenu non écrasé
 - √ Contenant des principes actifs instables à l'air ou à la lumière
 - √ A base de substances irritantes
 - √ Contenant des principes actifs toxiques
 - √ Contenant des substances à marge thérapeutique étroite (AVK, anticonvulsivant, digoxine)
 - √ Contenant un excipient huileux (capsules)

















Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Nom : Menard Fonction : Pharmacien Date : 06/10/2016	Nom : Pégoud Fonction : Pharmacien Date : 04/11/2016	Nom : Fonction : Date :

















EN PRATIQUE

















- ⇒ Vérifier si le médicament ne peut être remplacé par une autre forme (liquide, sachet, cpr effervescent, dispersible, suppositoire) ou un autre médicament
- ⇒ Vérifier si le comprimé peut être écrasé ou coupé, la gélule ouverte
 - ✓ Sur le Vidal® à la rubrique posologie
 - ✓ Sur le guide d'utilisation des médicaments
 - ✓ En appelant la pharmacie
- ⇒ Pour couper un comprimé utiliser de préférence un coupe comprimé
- ⇒ L'administration après ouverture des gélules ou broyage des comprimés doit toujours se faire extemporanément pour éviter toute altération du principe actif (les principes actifs peuvent être instables à l'air ou à la lumière)
- ⇒ Ne pas écraser plusieurs comprimés en même temps
- ⇒ Pulvériser le plus finement possible et ajouter un volume de liquide suffisant ou un aliment pour cacher un goût désagréable
- ⇒ Laver le mortier ou le broyeur après chaque utilisation
- ⇒ Bien rincer la sonde de nutrition entérale après chaque administration du médicament














LEGENDE

















	Dissolution possible dans l'eau		Ne pas découper
	Ouverture possible des gélules		Ne pas ouvrir les gélules
	Ecrasement possible des comprimés		Ne pas écraser les comprimés
	Produit dangereux ou cytotoxique		Ne pas ouvrir, écraser les capsules

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Abilify 5mg	ARIPIRAZOLE	Comprimé		NON		Abilify 10 mg ou 15 mg cp orodispersible
Abilify 10 et 15mg	ARIPIRAZOLE	Comprimé orodispersible		OUI	Laisser fondre sous la langue ou dans un verre d'eau	
Abstral 100mcg et 200mcg	FENTANYL	Comprimé sublingual		NON	Ne pas écraser. Laisser fondre sous la langue.	Dispositifs transdermiques
Ac Alendronique 70mg (Fosamax)	ACIDE ALENDRONIQUE	Comprimé		NON	Principe actif très irritant pour les muqueuses buccales et oesophagiennes : Ne pas laisser fondre, ne pas sucer, ne pas croquer	
Aciclovir 200mg (Zovirax)	ACICLOVIR	Comprimé		NON		Zovirax 200mg/5ml susp buvable
Acide folique 0,4mg et 5mg (Speciafoldine)	ACIDE FOLIQUE	Comprimé		OUI		
Actiq 200mcg et 400mcg	FENTANYL	Comprimé avec applicateur buccal		NON	Laisser fondre au contact de la muqueuse buccale sans le sucer, le mâcher ou le croquer	Dispositifs transdermiques
Actiskenan 5mg, 10mg et 20mg	MORPHINE	Gélule		OUI	Ne pas écraser les granules. Mélanger avec aliment semi-liquides (compote)	Oramorph solution buvable
Adalate 10mg	NIFEDIPINE	Capsule molle		NON	Ne pas ouvrir, ne pas croquer. Principe actif photosensible	
Adalate LP 20mg	NIFEDIPINE	Comprimé à libération prolongée		NON	Principe actif photosensible. Forme à libération prolongée	
Adcirca 20mg	TADALAFIL	Comprimé pelliculé		NON		
Adempas 0,5mg, 1mg, 1,5mg, 2mg, 2,5mg	RIOCIGUAT	Comprimé pelliculé		NON	Administration extemporanée. Mélanger à de l'eau ou à des aliments semi-liquides (compote)	
Afinitor 10mg	EVEROLIMUS	Comprimé		NON	Tératogène et embryotoxique. Avaler entier. Irritant pour les muqueuses buccales et oesophagiennes	
Akineton retard LP 4mg	BIPERIDENE	Comprimé pelliculé à libération prolongée		NON		
Aldactazine 25mg/15mg (Spironolactone + Altizide)	ALTIZINE + SPIRONOLACTONE	Comprimé sécable		OUI	Mettre en suspension dans du sirop ou des aliments semi-liquides. Insoluble dans l'eau	
Aldactone 25mg et 75 mg (Spironolactone)	SPIRONOLACTONE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Goût très désagréable. Mettre en suspension dans du sirop ou des aliments semi-liquides. Insoluble dans l'eau	

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Aldomet 250mg	METHYLDOPA	Comprimé pelliculé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. Possibilité de mettre dans une compote	
Alkeran 2mg	MELPHALAN	Comprimé pelliculé		NON	Produit cytotoxique. Ne pas écraser, ni croquer	
Alkonatrem 150mg	DEMECLOCYCLINE	Gélule		OUI	Mélanger à des liquides ou des aliments mais éviter avec le lait, les antiacides	
Allopurinol 100mg (Zyloric)	ALLOPURINOL	Comprimé		OUI	Administration extemporanée. Principe actif sensible à l'humidité. Mélanger à de l'eau ou à des aliments semi-liquides (compote)	
Alprazolam 0,25mg, 0,5mg et 1mg (Xanax)	ALPRAZOLAM	Comprimé sécable		OUI		
Alpress LP 2,5mg et LP 5mg	PRAZOSINE	Comprimé LP osmotique		NON	Ne pas casser, ni broyer, ni mâcher. Forme à libération prolongée	Eupressyl : adapter la posologie
Amlodipine 5mg (Amlor)	AMLODIPINE	Gélule		OUI	Principe actif peu soluble dans l'eau : prudence lors de l'administration par sonde	
Amoxicilline 500mg (Clamoxyl)	AMOXICILLINE	Gélule		NON		Amoxicilline 500mg/5ml sirop
Amoxicilline/Ac clavulanique 500mg/62,5mg (Augmentin)	AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE	Comprimé pelliculé		NON		Amoxicilline/Ac clavulanique 1g/125mg sachet pdre pour susp buv
Anastrozole 1mg (Arimidex)	ANASTROZOLE	Comprimé pelliculé		NON	Produit cytotoxique	
Aotal 333mg	ACAMPROSATE	Comprimé gastro-résistant		NON		
Atenolol 100mg (Tenormine)	ATENOLOL	Comprimé sécable		OUI	Administration extemporanée	
Atorvastatine 10mg, 40mg et 80mg (Tahor)	ATORVASTATINE	Comprimé pelliculé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. Peu soluble dans l'eau	
Atripla 600/200/245mg	EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR	Comprimé pelliculé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Azathioprine 50mg (Imurel)	AZATHIOPRINE	Comprimé		NON	Produit cytotoxique. Ne pas écraser, ni croquer	
Baclofène 10mg (Lioresal)	BACLOFENE	Comprimé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. Administrer sur aliment semi-solide. Ne pas dissoudre au préalable	

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Bactrim forte 800mg/160mg	SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIME	Comprimé		OUI	Ecrasement difficile et goût désagréable : <u>Préferer la suspension buvable</u>	Bactrim 200mg/40mg susp buvable
Betahistine 8mg (Serc)	BETAHISTINE	Comprimé		OUI		
Bicalutamide 50mg (Casodex)	BICALUTAMIDE	Comprimé enrobé		OUI	Protection par gants et masque. Administration extemporanée.	
Biltricide 600mg	PRAZIQUANTEL	Comprimé pelliculé quadrisécable		OUI	A disperser dans l'eau. <u>Ne pas croquer, ni écraser</u>	
Bi-Profenid LP 100mg	KETOPROFENE	Comprimé sécable à libération prolongée		NON		Profenid (Ketoprofene) 100mg Suppo ou Autre AINS. Adapter la posologie
Bisoce Ge 1,25mg, 2,5mg et 5mg (Bisoprolol)	BISOPROLOL	Comprimé pelliculé		NON		
Bisoprolol 10mg (Detensiel)	BISOPROLOL	Comprimé		OUI	Goût amer	
Brilique 50mg	TICAGRELOR	Comprimé pelliculé		OUI	Administration extemporanée : Ecraser et mélanger dans un demi-verre d'eau, rincer et administrer l'eau de rinçage	
Bromazepam 6mg (Lexomil)	BROMAZEPAM	Comprimé quadrisécable		OUI		
Buprenorphine 0,4mg, 1mg, 2mg et 8mg (Subutex)	BUPRENORPHINE	Comprimé sublingual		NON	Ne pas croquer. Laisser fondre sous la langue	
Buspirone 10mg (Buspar)	BUSPIRONE	Comprimé sécable		OUI		
Carbamazepine LP 200mg et LP 400mg (Tegretol)	CARBAMAZEPINE	Comprimé pelliculé sécable à libération prolongée		NON	Ne pas croquer, ne pas macher	Tegretol 20mg/ml susp buvable Forme non LP
Catapressan 0,15 mg	CLONIDINE	Comprimé sécable		NON		
Celiprolol 200mg (Celectol)	CELIPROLOL	Comprimé enrobé sécable		OUI	Administrer de préférence le matin avec un liquide à jeun. Ne doit pas être en contact avec la muqueuse buccale	
Cellcept 250mg	MYCOPHENOLATE	Gélule		NON	Tératogène et embryotoxique	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Cellcept 500mg	MYCOPHENOLATE	Comprimé pelliculé		NON	Tératogène et embryotoxique	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Celltop 25mg	ETOPOSIDE	Capsule molle		NON	Produit cytotoxique Excipient irritant les muqueuses. Impossible car capsule (contenu liquide huileux)	
Ceris 20mg	TROSPIUM	Comprimé enrobé		NON	Goût très amer. Avaler entier avec un grand verre d'eau, à jeun.	
Cétirizine 10mg (aerius)	CETIRIZINE	Comprimé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Cholurso 250mg (Delursan)	ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE	Comprimé pelliculé		OUI	Mélanger avec confiture ou compote, goût amer	
Cimétidine 200mg (Tagamet)	CIMETIDINE	Comprimé effervescent		OUI		
Ciprofloxacine 500mg et 750mg (Ciflox)	CIPROFLOXACINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Citalopram 20mg (Seropram)	CITALOPRAM	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Goût amer	Seropram 40mg/ml, sol buv, fl. de 12ml
Clarithromycine 500mg (Zeclar)	ZECLAR	Comprimé		OUI	Goût amer	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Clomipramine 10 et 25mg (Anafranil)	CLOMIPRAMINE	Comprimé enrobé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	
Clomipramine 75mg (Anafranil)	CLOMIPRAMINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		Anafranil 10 et 25mg cpr peuvent être écrasés
Clopixol 10 et 25mg	ZUCLOPENTHIXOL	Comprimé pelliculé		NON		Clopixol 2 % sol buv (1mg/goutte). Peut être mélangée à de l'eau
Clozapine 25mg et 100mg (Leponex)	CLOZAPINE	Comprimé		NON	Insoluble dans l'eau	
Colchicine 1mg	COCHICINE	Comprimé		OUI	Administration extemporanée. Goût amer : mélanger avec compote ou confiture	
Combivir 150mg/300mg	LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Comtan 200mg	ENTACAPONE	Comprimé pelliculé		OUI	Administrer avec un aliment semi-solide. Ne pas dissoudre dans l'eau. Risque perte en principe actif (jaune, très colorant) lors du broyage.	
Contramal LP 100mg (Zamudol)	TRAMADOL	Comprimé à libération prolongée		NON	Ne pas croquer ni écraser les comprimés LP	Zamudol LP 50 (ouvrir les gélules) ou Contramal solution buvable : Adapter la posologie car non LP

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Cordarone 200mg	AMIODARONE	Comprimé sécable		OUI		
Corgard 80mg	NADOLOL	Comprimé sécable		OUI	Principe actif peu soluble dans l'eau	
Cortancyl 1mg, 5mg et 20mg (Prednisone)	PREDNISONE	Comprimé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	SOLUPRED® (prednisolone) cpr orodispersible 5mg - 20mg ADAPTER LA POSOLOGIE
Cotellic 20mg	COBIMETINIB	Comprimé pelliculé		NON	Produit cytotoxique. Ne croquer, ni écraser	
Coumadine 2mg et 5mg	WARFARINE	Comprimé sécable		OUI	ATTENTION Marge thérapeutique étroite. Administration extemporanée. Surveillance INR+++	
Créon 25000 U	PANCREATINE	Gélule de microgranules gastro-résistantes		OUI	Ne pas écraser les microgranules	
Cyproterone 50mg (Androcur)	CYPROTERONE	Comprimé sécable		OUI		
Cytotec 200mg	MISOPROSTOL	Comprimé sécable		OUI		
Dafalgan codeïne 500mg/30mg	PARACETAMOL + CODEINE	Comprimé effervescent		OUI	Goût très amer	
Daklinza 60mg	DACLATASVIR	comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ne pas écraser, ne pas mâcher	
Dalacine 150mg et 300mg	CLINDAMYCINE	Gélule		OUI		
Dantrium 25mg et 100mg	DANTROLENE	Gélule		OUI	Mélanger avec aliment, peu soluble dans l'eau	
Daonil 5mg	GLIBENCLAMIDE	Comprimé sécable		OUI	Goût amer	
Decontractyl 500 mg	MEPHENESINE	Comprimé enrobé		NON		
Dépakine chrono LP 500mg	VALPROATE DE SODIUM	Comprimé sécable		NON	Ne pas croquer, ni écraser	Micropakine LP sachets
Depakote 250mg et 500mg	DIVALPROATE DE SODIUM	Comprimé gastro-résistant		NON	Ne pas croquer, ni écraser	

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Depamide 300mg	VALPROMIDE	Comprimé gastro-résistant		NON	Ne pas croquer, ni écraser	
Dexambutol 500mg (Myambutol)	ETHAMBUTOL	Comprimé pelliculé		OUI	Mélanger à une boisson ou un aliment	
Diamox 250mg	ACETAZOLAMIDE	Comprimé sécable		OUI	Goût amer : administrer avec un aliment ou du sirop	
Dicodin LP 60mg	DIHYDROCODEINE	Comprimé à libération prolongée		NON		
Diffu-K 600mg	POTASSIUM CHLORURE	Gélule		OUI	Ne pas écraser le contenu. Eviter la prise simultanée de lait. <u>Préferer les formes buvables</u>	Potassium Richard; Gluconate de potassium H3 santé sirop. Adapter la posologie
Dificlir 200mg	FIDAXOMICINE	Comprimé pelliculé		OUI	Stable pendant 2h dans de l'eau et la compote de pomme	
Digoxine 0,25 mg	DIGOXINE	Comprimé sécable		NON	ATTENTION Marge thérapeutique étroite	Digoxine pédiatrique 0,05 mg/ml sol buvable
Diphantoïne 100mg (Di-hydan 100mg)	PHENYTOINE	Comprimé sécable		OUI	Si sonde : interrompre la nutrition entérale 2h avant et après	
Dipiperon 40mg	PIPAMPERONE	Comprimé sécable		NON		Dipiperon solution buvable 40 mg/ml, fl de 30 ml
Doliprane 500mg	PARACETAMOL	Gélule		OUI	Goût très amer. <u>Préferer les sachets</u>	Paracetamol 500 mg sachet
Domperidone 10mg (Motilium)	DOMPERIDONE	Comprimé orodispersible		NON		Motilium susp buvable (Domperidone)
Donepezil 5mg et 10mg (Aricept)	DONEPEZIL	Comprimé orodispersible		OUI	A placer sur la langue avec ou sans eau	
Doxycycline 100mg (Granudoxy)	DOXYCYCLINE	Comprimé		OUI	Bien agiter après la dispersion du comprimé dans l'eau, ne pas mélanger avec du lait	
Solupred 5mg et 20mg	PREDNISOLONE	Comprimé orodispersible		OUI	A dissoudre dans l'eau ou à faire fondre sous la langue	
Driptane 5mg (Ditropan)	OXYBUTYNINE	Comprimé sécable		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	
Dulcolax 5mg	BISACODYL	Comprimé enrobé, gastrorésistant		NON	Ne pas croquer, ni écraser	X-prep sachet (laxatif stimulant) ou autre classe de laxatif

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Duloxetine 30mg (Cymbalta)	DULOXETINE	Gélule gastro-résistante		NON	gélule gastro-résistante. Principe actif irritant	
Duphaston 10mg	DYDROGESTERONE	Comprimé pelliculé		OUI	Administration extemporanée	
Duspatalin 200mg (Mebeverine)	MEBEVERINE	Gélule		NON	Ne pas écraser les microgranules	
Efavirenz 600mg (Sustiva)	EFAVIRENZ	Comprimé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Efient 10mg	PRASUGREL	Comprimé		OUI	Goût amer : mélanger avec un aliment ou un liquide. Administration extemporanée	
Eliquis 2,5mg et 5mg	APIXABAN	Comprimé pelliculé		NON	ATTENTION Marge thérapeutique étroite Augmentation du risque de saignement	
Emend 80mg et 125mg	APREPITANT	Gélule		NON	Ne pas ouvrir la gélule, ni écraser le contenu	
Endoxan 50mg	CYCLOPHOSPHAMIDE	Comprimé pelliculé		NON	Produit cytotoxique	
Entresto 24/26mg et 49/51mg	SACUBITRIL + VALSARTAN	comprimé pelliculé		NON		
Epitomax 25mg	TOPIRAMATE	Gélule		OUI	Ne pas écraser le contenu : mélanger à un aliment semi-solide et avaler sans mâcher. Administration extemporanée	
Epitomax 50mg	TOPIRAMATE	Comprimé		NON	Ne pas croquer, ni couper	Epitomax 25mg gélules peuvent être ouvertes
Esidrex 25mg	HYDROCHLOROTHIAZIDE	Comprimé sécable		OUI	Goût désagréable, administration extemporanée sur un aliment semi-solide. Ne pas dissoudre au préalable	
Esperal 500mg	DISULFIRAME	Comprimé		OUI		
Euphylline 100mg et 300mg	THEOPHYLLINE	Gélule LP		NON	Ne pas écraser le contenu. Mélanger avec un aliment liquide ou semi-liquide. Administration extemporanée	
Eupressyl 30mg et 60mg (Mediatensyl)	URAPIDIL	Gélule		NON	Ne pas écraser les microgranules. Administration extemporanée (libération du principe actif dans l'eau)	
Eurelix LP 6mg	PIRETANIDE	Gélule		OUI	Ne pas écraser les microgranules LP	

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Eviplera 200/25/245mg	EMTRICITABINE + RILPIVIRINE + TENOFOVIR	Comprimé pelliculé		NON		Avis Infectio nécessaire
Exacor 130 mg (Cipralan)	CIBENZOLINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI		
Exviera 250mg	DASABUVIR	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas mâcher, ni casser, ni dissoudre	
Flagyl 500mg	METRONIDAZOLE	Comprimé pelliculé		NON		Flagyl 125mg/5ml, susp buv, fl. de 120ml
Flecaine LP 50mg	FLECAINIDE	Gélule à libération prolongée		OUI	Ne pas écraser les microgranules LP	
Flecaïnide 100mg (FLECAINE)	FLECAINIDE	Comprimé sécable		OUI		
Flodil LP 5mg	FELODIPINE	Comprimé enrobé à libération prolongée		NON	Ne pas diviser, ni croquer, ni mâcher	
Fluconazole 50mg et 200mg (Triflucan)	FLUCONAZOLE	Gélule		OUI	Mélanger avec un aliment semi-solide	Fluconazole buvable 50mg/5ml, flacon de 35ml (Triflucan)
Flucortac 50 µg	FLUDROCORTISONE	Comprimé sécable		OUI	Ecraser et dissoudre dans du jus de fruit ou de l'eau à température ambiante. Administration extemporanée	
Fludex LP 1,5mg	INDAPAMIDE	Comprimé pelliculé à libération prolongée		NON	Ne pas croquer, ni écraser	Autre diurétique hypokaliémiant +/- avis spécialisé
Fludrocortisone 10mcg	FLUDROCORTISONE	Comprimé sécable		OUI	Administration extemporanée	
Fluoxetine 20mg (Prozac)	FLUOXETINE	Comprimé dispersible sécable		OUI	Ne pas croquer, dissoudre dans un liquide	
Fluvermal 100mg	FLUBENDAZOLE	Comprimé sécable		OUI		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Folinoral 25mg	CALCIUM FOLINATE	Gélule		OUI	Diluer au préalable avec de l'eau. Prudence lors de l'administration par sonde : risque adhérence à la tubulure	
Fucidine 250mg	ACIDE FUSIDIQUE	Comprimé pelliculé		OUI	Goût amer : mélanger avec un liquide sucré (sauf laitage). Administration extemporanée	
Fumafer 66mg	FUMARATE FERREUX	Comprimé pelliculé		NON		Ferrostrane sirop 125ml

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Furadantine 50mg	NITROFURANTOINE	Gélule		OUI	Mélanger à un aliment solide ou liquide. Administration extemporanée	
Gabacet 400mg (Nootropyl)	PIRACETAM	Gélule		NON	Ne pas ouvrir, ni croquer	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Gabapentine 100mg et 300mg (Neurontin)	GABAPENTINE	Gélule		OUI	Goût amer : mélanger à un aliment liquide ou solide	
Gabapentine 600mg (Neurontin)	GABAPENTINE	comprimé pelliculé		NON		Gabapentine gélules 100mg et 300mg (Neurontin)
Galvus 50mg	VILDAGLIPTINE	Comprimé pelliculé		NON		
Gardenal 10mg, 50mg et 100mg	PHENOBARBITAL	Comprimé		OUI		
Giotrif 20mg et 40mg	AFATINIB	Comprimé pelliculé		OUI	Produit cytotoxique. Protection par gants et masque. Disperser SANS ECRASER dans 100 ml d'eau plate . Administrer le liquide de rinçage	
Gliclazide 30mg LM (Diamicron)	GLICLAZIDE	Comprimé LM		NON		Avis spécialisé
Glimépiride 1mg, 2mg et 3mg (Amarel)	GLIMEPIRIDE	Comprimé		OUI*	*non recommandé par le laboratoire. Renforcer la surveillance glycémique	
Glucor 50mg et 100mg	ACARBOSE	Comprimé (sécable pour le 100mg)		OUI		
Gutron 2,5mg	MIDODRINE	Comprimé		OUI*	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. Mélanger avec de l'eau seulement	
Haldol 1mg et 5mg	HALOPERIDOL	Comprimé		NON	Ne pas croquer, ni mâcher	Haldol 2mg/ml, sol buv en gouttes, fl. de 15ml
Harvoni 90mg/400mg	LEDIPAVIR + SOFOSBUVIR	Comprimé pelliculé		NON		
Hemidaonil 2,5mg	GLIBENCLAMIDE	Comprimé sécable		OUI		
Hemigoxine 0,125mg	DIGOXINE	Comprimé		NON	ATTENTION Marge thérapeutique étroite	Digoxine pédiatrique 0,05 mg/ml buvable
Heptamyl 187,8mg	HEPTAMINOL	Comprimé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Hydrea 500mg	HYDROXYCARBAMIDE	Gélule		NON	Produit cytotoxique. Protection par gants et masque. Administration extemporanée	
Hydrocortisone 10mg	HYDROCORTISONE	Comprimé sécable		OUI	Mélanger avec un aliment	
Hydroxyzine 25 mg (Atarax)	HYDROXYZINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	<u>Préférer la forme sirop</u> car goût désagréable	Atarax Sirop 2mg/ml, fl 200ml
Hyperium 1mg	RILMENIDINE	Comprimé		OUI	Administration extemporanée après lise en suspension	
Ibuprofène 200mg	IBUPROFENE	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ne pas sucer. Goût amer	Advil 20mg/ml, susp buv, fl. de 200ml
Ikorel 10mg (Adancor)	NICORANDIL	Comprimé sécable		OUI		
Imbruvica 140mg	IBRUTINIB	Gélule		NON	Produit cytotoxique Ne pas ouvrir, ni mâcher	
Imeth 2,5mg (Methotrexate)	METHOTREXATE	Comprimé		NON	Produit cytotoxique	
Imnovid 1mg, 2mg, 3mg et 4mg	POMALIDOMIDE	Gélule		NON	Produit cytotoxique Ne pas ouvrir, ni mâcher	
Imodium 2mg (Loperamide)	LOPERAMIDE	Gélule		NON	Ne pas écraser le contenu	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Imovane 3,75mg (Zopiclone)	ZOPICLONE	Comprimé pelliculé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. Goût amer	
Indocid 25mg	INDOMETACINE	Gélule		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Inspra 25mg	EPLERENONE	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	
Intelence 100mg	ETRAVIRINE	Comprimé sécable		OUI	Disperser dans un verre d'eau	
Invirase 500mg	SAQUINAVIR	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Irbesartan 75mg et 150mg (Aprovel)	IRBESARTAN	Comprimé pelliculé		OUI	Administration extemporanée. Mélanger à un aliment, insoluble dans l'eau	

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Iressa 250mg	GEFITINIB	Comprimé pelliculé		OUI	Produit cytotoxique Protection par gants et masque. Disperser SANS ECRASER dans 100 ml d'eau plate . Administrer le liquide de rinçage	
Isentress 400mg	RALTEGRAVIR	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni écraser ou couper	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Isoptine 120mg	VERAPAMIL	Gélule		OUI		
Isoptine 40mg	VERAPAMIL	Comprimé pelliculé		OUI		
Isoptine LP 240mg	VERAPAMIL	Comprimé pelliculé sécable		NON		Isoptine 40mg ou 120mg. Adapter la posologie car formes non LP
Itraconazole 100mg (Sporanox)	ITRACONAZOLE	Gélule		NON	Prudence : risque de colmatage des sondes	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Ixprim 37,5mg/325mg	TRAMADOL + PARACETAMOL	Comprimé pelliculé		OUI	Administration extemporanée. Goût amer	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Kaletra 200mg/50mg	LOPINAVIR + RITONAVIR	Comprimé pelliculé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Lamivudine 150mg (Epivir)	LAMIVUDINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		EPIVIR solution buvable 10mg/ml, fl 240ml
Lamotrigine 5mg, 25mg, 100mg et 200mg (Lamictal)	LAMOTRIGINE	Comprimé dispersible ou à croquer		OUI		
Lansoprazole 15mg et 30mg (Ogastoro)	LANSOPRAZOLE	Comprimé orodispersible		OUI	Dissoudre dans un peu d'eau ou laisser fondre sous la langue. Prudence : risque de colmatage des sondes. Bien rincer la sonde après administration	
Largactil 25mg et 100mg	CHLORPROMAZINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		Largactil 4%, sol buv en gouttes, fl. de 30ml
Laroxyl 25mg et 50mg	AMITRIPTYLINE	Comprimé pelliculé		NON		Laroxyl 40 mg/ml sol buvable, Fl 20ml
Lasilix 20mg et 40mg (Furosemide)	FUROSEMIDE	Comprimé (sécable pour le 40mg)		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. <u>Préferer la solution buvable</u>	Lasilix buvable 10mg/ml, Fl 60ml
Lasilix retard 60mg	FUROSEMIDE	Gélule		OUI	Ne pas écraser les granules	Lasilix buvable 10mg/ml, Fl 60ml (non retard)
Lasilix spécial 500mg	FUROSEMIDE	Comprimé sécable		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. <u>Préferer la solution buvable</u>	

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Lepticur 10mg	TROPATEPINE	Comprimé		OUI		
Letrozole 2,5mg (Femara)	LETROZOLE	Comprimé pelliculé		OUI	Aadministrer sur un aliment semi-solide, ne pas dissoudre au préalable	
Levetiracetam 500mg (Kepra)	LEVETIRACETAM	Comprimé enrobé sécable		OUI	Goût amer	Levetiracetam 100 mg/ml sol buvable (Kepra)
Levodopa / Carbidopa 100mg/10mg (Sinemet)	LEVODOPA + CARBIDOPA	Comprimé sécable		NON	Ne pas croquer, ni mâcher ou écraser	
Levodopa / Carbidopa LP 100mg/10mg (Sinemet)	LEVODOPA + CARBIDOPA	Comprimé à libération prolongée		NON	Ne pas croquer, ni mâcher ou écraser	
Levofloxacin 500mg (Tavanic)	LEVOFLOXACINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	
Levothyrox 50mcg et 100mcg	LEVOTHYROXINE	Comprimé sécable		OUI	<u>Préferer la solution buvable en gouttes</u>	L-Thyroxine 150 mcg/ml sol buvable
Lipanthyl 160mg	FENOFIBRATE	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni mâcher ou écraser	
Lopressor LP 200mg (Seloken)	METOPROLOL	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer ou écraser : Forme à libération prolongée	
Loramyc 50mcg	MICONAZOLE	Comprimé gingival		NON	Appliquer sur la gencive supérieure	
Lormetazepam 1mg (Noctamide)	LORMETAZEPAM	Comprimé sécable		OUI	Possibilité de dissoudre dans l'eau	
Loxapac 25mg et 100 mg	LOXAPINE	Comprimé pelliculé		NON	Modification de la pharmacocinétique et efficacité	Loxapac 25 mg/ml sol buvable
Loxen LP 50mg	NICARDIPINE	Gélule à libération prolongée		OUI	Ne pas écraser le contenu (granules LP)	Autre inhibiteur calcique disponible au CHPM (adapter la posologie)
Ludiomil 25mg	MAPROTILINE	Comprimé pelliculé		OUI	Prudence : risque de modification de la biodisponibilité	
Lynparza 50mg	OLAPARIB	Gélule		NON	Produit cytotoxique Ne pas ouvrir, ni mâcher	
Lyrica 25mg, 75mg et 300mg	PREGABALINE	Gélule		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Lysanxia 10mg et 40mg	PRAZEPAM	Comprimé (séable pour le 40 mg)		OUI	à déliter (en bouche ou dans un peu d'eau). <u>Préferer la suspension buvable</u>	Lysanxia 15 mg/ml sol buvable, FI 20ml
Lysodren 500mg	MITOTANE	Comprimé séable		NON	Produit cytotoxique	
Magné B6 48mg/5mg	MAGNESIUM + VIT B6(PYRIDOXINE)	Comprimé enrobé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	
Malarone 250/100mg	ATOVAQUONE + PROGUANIL	Comprimé		OUI		
Malocide 50mg	PYRIMETHAMINE	Comprimé		OUI		
Mantadix 100 mg	AMANTADINE	Capsule molle		NON	Impossible car contenu pâteux	
Medrol 100mg	METHYLPREDNISOLONE	Comprimé		OUI	dissoudre dans de l'eau	préférer anti-inflammatoire stéroïdien soluble type Solupred
Memantine 10mg (Ebixa)	MEMANTINE	Comprimé pelliculé séable		OUI	Goût amer, ne pas mélanger avec du pampleousse	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Mestinon 60mg	PYRIDOSTIGMINE	Comprimé enrobé		OUI	Administration extemporanée	
Metformine 1000mg (Glucophage)	METFORMINE	Comprimé pelliculé séable		OUI	Goût très amer	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Methadone 1mg, 5mg, 5mg, 10mg, 40mg	METHADONE	gélule		NON		Methadone sirop
Mianserine 10mg et 60mg (Athymil)	MIANSERINE	Comprimé pelliculé		OUI	Ne pas croquer. Anesthésique au contact des muqueuses. Administration extemporanée	
Micropakine LP 100mg, 250mg, 500mg, 750mg et 1000mg	VALPROATE SODIUM	Granulés à libération prolongée (sachets)		NON	Ne pas écraser les granulés. Possibilité de les mélanger à un aliment mou ou à un liquide (mais pas à des aliments ni à des liquides chauds)	
Mifegyne 200mg	MIFEPRISTONE	Comprimé		NON		
Minirinmelt 60mcg	DESMOPRESSINE	Lyophilisat oral		NON	Laisser fondre sous la langue	
Mirtazapine 15mg (Norset)	MIRTAZAPINE	Comprimé orodispersible		OUI		

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Moclamine 150mg	MOCLOBEMIDE	Comprimé pelliculé sécable		OUI		
Modopar 125mg	LEVODOPA + BENSERAZIDE	Comprimé dispersible		OUI	Dissoudre dans de l'eau. Agiter avant emploi. Administrer en dehors d'un repas, dans la 1/2 heure qui suit sa préparation (noircissement possible par oxydation).	
Modopar 62,5mg et 250mg	LEVODOPA + BENSERAZIDE	Gélule		NON		Modopar 125mg cpr dispersible
Modopar LP 125mg	LEVODOPA + BENSERAZIDE	Gélule à libération prolongée		NON	Forme à libération prolongée	Modopar 125mg cpr dispersible : Adapter la posologie
Moduretic 5mg/50mg	AMILORIDE + HYDROCHLOROTHIAZIDE	Comprimé sécable		OUI	Gout désagréable	
Mogadon 5mg	NITRAZEPAM	Comprimé sécable		OUI	Administration extemporanée	
Molsidomine 2mg et 4mg (CORVASAL)	MOLSIDOMINE	Comprimé sécable (2 mg)		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	
Monicor LP 20mg	ISOSORBIDE MONONITRATE	Gélule à libération prolongée		OUI	Ne pas écraser le contenu (microgranules LP). Administration extemporanée	
Mono tildiem LP 200mg et 300mg	DILTIAZEM	Gélule à libération prolongée		OUI	Ne pas écraser le contenu (microgranules LP). Administration extemporanée	
Montelukast 10mg (Singulair)	MONTELUKAST	Comprimé pelliculé		NON		Singulair 4mg sachets-dose (Ped)
Mysoline 250mg	PRIMIDONE	Comprimé sécable		OUI		
Naltrexone 50mg (Revia)	NALTREXONE	Comprimé sécable		OUI		
Nebivolol 5mg (Temerit)	NEBIVOLOL	Comprimé quadrisécable		NON		
Neo mercazole 5mg et 20mg	CARBIMAZOLE	Comprimé		NON	Peu soluble dans l'eau. Déconseillé pour SNG (adhérence à la tubulure)	
Neoral 10mg, 25mg et 50mg	CICLOSPORINE	Capsule molle		NON	Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Neuleptil 10mg	PROPERICIAZINE	Gélule		NON		Neuleptil 4% sol buvable, Fl 30ml

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Neuleptil 25 mg	PROPERICIAZINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		Neuleptil 4% sol buvable, FI 30ml
Nicobion 500mg	VITAMINE PP = NICOTINAMIDE	Comprimé pelliculé		NON	Goût amer et très colorant	
Nifluril 250mg	NIFLUMIQUE ACIDE	Gélule		OUI	Goût désagréable, <u>préferer Nifluril suppo</u>	Nifluril 400mg et 700mg, suppositoires.
Nimotop 30mg	NIMODIPINE	Comprimé pelliculé		NON	Principe actif photosensible. Eviter contact PVC	Nimotop injectable ou contacter la pharmacie
Norfloxacine 400mg (Noroxine)	NORFLOXACINE	Comprimé pelliculé		OUI	Goût très amer. Ne pas administrer avec des produits laitiers	
Norvir 100mg	RITONAVIR	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas mâcher, ni écraser ou couper	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Noxafil 100mg	POSACONAZOLE	Comprimé gastro-résistant		NON	Ne pas mâcher, ni écraser ou couper	Noxafil 40mg/ml solution buvable. <u>Attention posologie différente</u>
Nozinan 25mg et 100mg	LEVOMEPROMAZINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		Nozinan 4% sol buvable, FI 125ml
Ofev 100mg et 150mg	NINTEDANIB	Capsule molle		NON	Produit cytotoxique	
Ofloxacine 200mg (Oflocet)	OFLOXACINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Principe actif sensible à l'humidité et photosensible. Administration extemporanée	
Olanzapine 5mg, 10mg et 20mg (Zyprexa)	OLANZAPINE	Comprimé orodispersible		OUI	Laisser fondre sous la langue ou dans un verre d'eau	
Olanzapine 7,5mg (Zyprexa)	OLANZAPINE	Comprimé enrobé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	Olanzapine Orodispersible 5mg, 10mg ou 20mg
Olysio 150mg	SIMEPREVIR	Gélule		NON		
Oracefal 500mg (Cefadroxil)	CEFADROXIL	Gélule		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Oracilline 1 M UI	PENICILLINE V	Comprimé sécable		NON		Oracilline 0,25 MUI susp buvable
Orbenine 500mg	CLOXACILLINE	Gélule		NON		forme injectable

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Oxcarbazépine 300mg (Trileptal)	OXCARBAZÉPINE	Comprimé pelliculé		OUI	<u>Préferer la solution buvable</u>	Trileptal 60mg/ml solution buvable 250ml
Oxeol 10mg	BAMBUTEROL	Comprimé sécable		OUI		
Oxycodone LP 5mg, 10mg, 20mg, 40mg et 80mg (Oxycontin)	OXYCODONE CHLORHYDRATE	Comprimé pelliculé		NON	Forme à libération prolongée	
Oxynormo 5mg, 10mg et 20mg	OXYCODONE CHLORHYDRATE	Comprimé orodispersible		NON		Oxynorm 10mg/ml Fl 30ml Buvable
Pantoprazole 20mg et 40mg (Eupantol)	PANTOPRAZOLE	Comprimé gastro-résistant		NON	comprimé gastrorésistant	Lansoprazole 15 et 30mg cpr orodispersible, Inexium 10mg sachet (pédiatrie)
Parkinane LP 5mg	TRIHÉXYPHENIDYLE	Gélule		OUI	Ne pas écraser ou dissoudre les microgranules. <u>Préferer la solution buvable</u>	Artane 4% sol buv en gouttes : Adapter la posologie car non LP
Paroxétine 20mg (Deroxat)	PAROXÉTINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Comprimé avec enrobage assurant une libération contrôlée	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Pentasa 500mg	MESALAZINE	Comprimé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	Pentasa 1g, susp rectale Pentasa suppo
Pentoxifyline 400mg LP (Torental)	PENTOXIFYLLINE	Comprimé pelliculé		NON	Forme à libération prolongée	
Perindopril 2mg et 4mg (Coversyl)	PERINDOPRIL	Comprimé		OUI		
Perindopril/Indapamide 2,5mg/0,625mg (Preterax)	INDAPAMIDE + PERINDOPRIL	Comprimé sécable		OUI	Peut être administré en suspension après broyage	
Permixon 160mg (Tadenan)	PYGEUM AFRICANUM EXTRAIT	Gélule		NON		
Persantine 75mg	DIPYRIDAMOLE	Comprimé enrobé		NON	Goût très amer et fort pouvoir colorant	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Phenergan 25 mg	PROMETHAZINE	Comprimé enrobé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Phloroglucinol 80mg (Spasfon lyoc)	PHLOROGLUCINOL	Lyophilisat oral		OUI	A dissoudre dans l'eau ou à laisser fondre sous la langue	Spasfon Suppo
Pirilène 500mg	PYRAZINAMIDE	Comprimé sécable		OUI	Goût amer : masquer avec un aliment sucré comme de la confiture	

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Plaquenil 200mg	HYDROXYCHLOROQUINE	Comprimé pelliculé		NON	Gouût très amer	
Plavix 75mg et 300mg	CLOPIDOGREL	Comprimé pelliculé		OUI	Principe actif photosensible. Goût très amer	
Pradaxa 75mg, 110mg et 150mg	DABIGATRAN	Gélule		NON	ATTENTION Marge thérapeutique étroite Augmentation du risque de saignement	
Pravastatine 20mg et 40mg	PRAVASTATINE	Comprimé sécable		OUI		
Previscan 20mg	FLUINDIONE	Comprimé quadrisécable		OUI	ATTENTION Marge thérapeutique étroite Surveillance INR rapprochée	Faire attention à la précision de la dose+++
Prezista 600mg et 800mg	DARUNAVIR	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Primperan 10mg	METOCLOPRAMIDE	Comprimé sécable		NON		Primperan solution buvable, Fl 200ml
Princi B250mg/50mg (vit B1 B6)	VIT B1(THIAMINE) + VIT B6(PYRIDOXINE)	Comprimé pelliculé		NON	Goût très amer et odeur désagréable. Principe actif photosensible	
Procoralan 5mg et 7,5mg	IVABRADINE	Comprimé pelliculé sécable (5mg)		OUI	Dissolution possible sauf avec du jus de pamplemousse et produits laitier. Ne pas mélanger à d'autres médicaments	
Progesterone 100mg capsule	PROGESTERONE	Capsule molle		NON		solution injectable IM retard : adapter la posologie
Prograf 0,5mg et 1mg	TACROLIMUS	Gélule		OUI	Marge thérapeutique étroite. Peut être mélangé à de l'eau et administré par sonde nasogastrique	
Propranolol 40mg (Avlocardyl)	PROPRANOLOL	Comprimé sécable		OUI		
Propranolol LP 160mg (Avlocardyl)	PROPRANOLOL	Gélule		OUI	Ne pas écraser le contenu (microgranules gastrorésistantes)	
Propylex 50mg (Propylthiouracile)	PROPYLTHIOURACILE	Comprimé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	
Pyostacine 500mg	PRISTINAMYCINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Goût amer : Mélanger à un aliment sucré ou un produit laitier	
Quetiapine LP 50mg, 300mg et 400mg (Xeroquel)	QUETIAPINE	Comprimé à libération prolongée		NON		

















Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Quinimax 500mg (Quinine)	QUININE + QUINIDINE + CINCHONINE + CINCHONIDINE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Goût très amer	
Ramipril 2,5mg et 10mg (Triatec)	RAMIPRIL	comprimé sécable		NON	Ne pas mâcher, ni écraser ou couper	
Ranitidine 300mg (Azantac)	RANITIDINE	Comprimé pelliculé		NON	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	CIMETIDINE (=Tagamet) 200mg cp effervescents
Rasilez 150mg	ALISKIREN	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas mâcher, ni écraser ou dissoudre	
Renagel 800mg	SEVELAMER	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas mâcher, ni écraser ou couper	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Repaglinide 0,5mg et 1mg (Novonorm)	REPAGLINIDE	Comprimé		OUI	Adapter la posologie si besoin (modification de l'absorption et de l'efficacité)	
Retrovir 100mg	ZIDOVUDINE	Gélule		NON		Retrovir 100mg/10ml solution buvable
Revatio 20mg	SILDENAFIL	Comprimé pelliculé		OUI	Préferer la suspension buvable. Eviter le jus de pamplemousse	Revatio poudre pour suspension buvable 10mg/mL
Revlimid 5mg, 10mg, 15mg et 25mg	LENALIDOMIDE	Gélule		NON	Produit cytotoxique. Ne pas ouvrir, ni casser, ni mâcher	
Reyataz 300mg	ATAZANAVIR	Gélule		NON		Avis Infectio nécessaire
Riamet 20mg/120mg	ARTEMETHER + LUMEFANTRINE	comprimé		OUI		
Ribavirine 200mg (Rebetol)	RIBAVIRINE	gélule		NON	Tératogène et embryotoxique	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Rifater 120mg/50mg/300mg	RIFAMPICINE + ISONIAZIDE + PYRAZINAMIDE	Comprimé enrobé		OUI	Goût amer	
Rifinah 300mg/150mg	RIFAMPICINE + ISONIAZIDE	Comprimé enrobé		OUI		
Riluzole 50mg (Rilutek)	RILUZOLE	comprimé pelliculé		NON		
Rimactan 300mg (Rifadine)	RIFAMPICINE	Gélule		NON		Rifadine 2% susp buvable






Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Rimifon 50mg et 150mg	ISONIAZIDE	Comprimé		OUI	Goût très amer	
Risperidone 1mg (Risperdal)	RISPERIDONE	Comprimé pelliculé sécable		NON	Goût amer	Risperdal 1 mg/ml sol buvable ou Risperdaloro 2 et 4mg
Risperidone orodispersible 2mg et 4mg (Risperdaloro)	RISPERIDONE	Comprimé orodispersible		NON	Laisser fondre le comprimé sur la langue	Risperdal 1 mg/ml sol buvable
Rivotril 2mg	CLONAZEPAM	Comprimé sécable		NON		Rivotril 0,25% sol buvable
Ropinirole 0,25mg	ROPINIROLE	comprimé pelliculé		OUI	Principe actif très photosensible. Administration extemporanée	
Ropinirole LP 2mg	ROPINIROLE	Comprimé pelliculé à libération prolongée		NON		
Roxithromycine 150mg (Rulid)	ROXITHROMYCINE	Comprimé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Rythmodan LP 250mg (Isorythm)	DISOPYRAMIDE	Comprimé à libération prolongée		NON	Ne pas croquer, ni écraser	
Rythmol 300mg	PROPAFENONE	Comprimé enrobé sécable		OUI	Goût très amer et action anesthésique de surface.	
Salazopyrine 500mg	SULFASALAZINE	Comprimé enrobé gastro-résistant		NON	Ne pas croquer, ni casser ou écraser	
Sectral 200mg	ACEBUTOLOL	Comprimé pelliculé		NON	Non recommandé par le laboratoire. <u>Préferer la solution buvable</u>	Sectral 40 mg/ml sol buvable
Seloken 100mg	METOPROLOL	Comprimé sécable		OUI		
Serecor LP 300mg	HYDROQUINIDINE	Gélule		OUI	Ne pas écraser les microgranules gastrorésistantes	
Seresta 10mg et 50mg	OXAZEPAM	Comprimé sécable		OUI		
Seroplex 10mg	ESCITALOPRAM	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Goût amer	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Sertraline 25mg et 50mg (Zoloft)	SERTRALINE	Gélule		NON		

Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Setofilm 4mg et 8mg (Zophren)	ONDANSETRON	Film orodispersible		NON	Laisser fondre dans la bouche	
Sintrom 4mg	ACENOCOUMAROL	Comprimé sécable		NON	ATTENTION Marge thérapeutique étroite. A administrer à heure fixe. Surveillance INR	utiliser MINISINTRON 1mg : Attention à la dose et au risque de perte du principe actif
Skenan LP 10mg, 30mg, 60mg et 100mg	MORPHINE SULFATE	Gélule		OUI	Ne pas écraser les microgranules/ bien rincer la sonde. S'assurer que la sonde est de taille suffisante	Solution buvable de morphine : NON LP
Sodium Bicarbonate 500mg	SODIUM BICARBONATE	gélulé		OUI		
Sodium Chlorure 0,5g	CHLORURE DE SODIUM	Comprimé		OUI	<u>Préferer les sachets de 1G</u>	Sodium Chlorure 1g Sachets
Solian 100mg, 200mg et 400mg	AMISULPRIDE	Comprimé sécable (pelliculé pour le 400mg)		NON	Ne pas croquer, ni mâcher ou écraser	Solian 100 mg/ml sol buvable
Sotalol 80mg (Sotalex)	SOTALOL	Comprimé		OUI		
Sovaldi 400mg	SOFOSBUVIR	comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni couper ou écraser	
Stablon 12,5mg	TIANEPTINE	Comprimé enrobé		OUI	Administration extemporanée	
Stalevo tous dosages	LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE	Comprimé pelliculé		NON	Ecraser en dernier recours car diminution efficacité : Administration extemporanée sur un aliment semi-solide (ne pas dissoudre)	
Stribild 150mg/150mg/200mg/245mg	ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR	comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni couper ou écraser	Avis Infectio nécessaire
Stromectol 3mg	IVERMECTINE	Comprimé		OUI		
Sulfarlem S25	ANETHOLTRITHIONE	Comprimé enrobé		NON		
Tagrisso 40mg et 80mg	OSIMERTINIB	comprimé pelliculé		OUI	Produit cytotoxique. Protection par gants et masque. Disperser SANS ECRASER dans 50 ml d'eau plate (15ml si sonde). Administrer le liquide de rinçage	
Tamiflu 30mg et 75mg	OSELTAMIVIR	Gélule		OUI		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Tamoxifene 20mg (Nolvadex)	TAMOXIFENE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Produit cytotoxique. Se protéger avec gants et masque. Administration extemporanée	

Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Tanganil 500mg	ACETYLLEUCINE	Comprimé		OUI		
Tarceva 100mg et 150mg	ERLOTINIB	Comprimé pelliculé		NON		
Tegretol 200 mg	CARBAMAZEPINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		Tegretol 20mg/ml susp buvable
Temesta 1mg et 2,5mg	LORAZEPAM	Comprimé sécable		OUI		
Temgesic 0,2mg	BUPRENORPHINE	Comprimé sublingual		NON	Ne pas croquer. Laisser fondre sous la langue	
Temodal 5mg, 20mg, 100mg et 250mg(Temozolomide)	TEMOZOLOMIDE	Gélule		NON	Produit cytotoxique et tératogène. Ne pas croquer, ouvrir ou mâcher	
Tenstaten 50mg	CICLETANINE	Gélule		OUI		
Teralithe 250mg	LITHIUM	Comprimé sécable		NON		
Teralithe LP400 mg	LITHIUM	Comprimé sécable à libération prolongée		NON	Forme à libération prolongée , ne pas écraser.	
Tercian 25 et 100mg	CYAMEMAZINE	Comprimé pelliculé sécable		NON		Tercian 4% sol buvable
Thalidomide 50mg	THALIDOMIDE	Gélule		NON	Produit cytotoxique et tératogène. Ne pas croquer, ouvrir ou mâcher	
Thiocolchocside (Coltramyl)	THIOLCHICOSIDE	Comprimé		OUI	Goût amer. Administration extemporanée	
Tiapridal 100mg	TIAPRIDE	Comprimé sécable		OUI	<u>Préferer la solution buvable</u>	Tiapridal 5 mg/goutte sol buvable
Ticlid 250mg	TICLOPIDINE	Comprimé pelliculé		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	
Tildiem 60mg (Diltiazem)	DILTIAZEM	Comprimé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	Autres inhibiteurs calciques disponibles au CHPM
Tiorfan 100mg	RACECADOTRIL	Gélule		NON	Goût désagréable masqué par l'enveloppe de la gélule. Prudence : risque de colmatage des sondes	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie

Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Tivicay 500mg	DOLUTEGRAVIR	Comprimé pelliculé		NON		Avis Infectio nécessaire
Tixtar 550mg	RIFAXIMINE	Comprimé pelliculé		NON		
Tracleer 32mg	BOSENTAN	comprimé quadrisécable dispersible		NON	Disperser dans un peu d'eau, administrer le liquide de rinçage	
Tracleer 62,5mg et 125mg	BOSENTAN	Comprimé pelliculé		NON		Tracleer 32mg (BOSENTANT), comprimés quadrisécables dispersibles
Trandate 200mg	LABETALOL	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée. Dissoudre dans de l'eau ou jus de fruit	
Tranxene 5mg, 10mg et 20mg	CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE	Gélule		OUI	Principe actif photosensible <u>Préferer LYSANXIA solution buvable</u>	Lysanxia 15 mg/ml sol buvable, Fl 20ml
Trimebutine 100mg (Debridat)	TRIMEBUTINE	Comprimé		NON		Debridat sachet 74,4mg
Trivastal LP 50mg	PIRIBEDIL	Comprimé enrobé à libération prolongée		NON	Forme à libération prolongée. Ne pas croquer, ni écraser	
Trolovol 300mg	PENICILLAMINE D	Comprimé pelliculé		OUI		
Truvada 200/245mg	EMTRICITABINE + TENOFOVIR	Comprimé pelliculé		OUI	Ne pas croquer. Déliter dans 100ml d'eau, de jus d'orange ou de raisin. Administration extemporanée	
Urbanyl 10mg et 20mg	CLOBAZAM	Comprimé (sécable pour le 10mg)		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Urbanyl 5mg	CLOBAZAM	Gélule		NON		
Uromitexan 400mg et 600mg	MESNA	Comprimé pelliculé sécable		NON		Forme injectable (buvable)
Valaciclovir 500mg (Zelitrex)	VALACICLOVIR	Comprimé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Valium 5mg et 10mg	DIAZEPAM	Comprimé sécable		NON	-	Valium 1% solution buvable en gouttes
Valsartan 40mg et 80mg (Tareg)	VALSARTAN	Comprimé pelliculé sécable		NON	Ne pas dissoudre. Administration extemporanée sur un aliment semi-solide	Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie

Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Venlafaxine LP 37.5mg et 75mg (Effexor)	VENLAFAXINE	Gélule		OUI	Ne pas écraser les microgranules LP. Administration extemporanée	
Vesanoid 10mg	ACIDE TOUT TRANS RETINOIQUE	Capsule molle		NON	Médicament cytotoxique et tératogène. Ne pas mâcher, ni croquer	
Vesicare 5mg et 10mg	SOLIFENACINE	comprimé pelliculé		NON	Ne pas croquer, ni écraser	
Vfend 50mg et 200mg	VORICONAZOLE	Comprimé pelliculé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Viekirax 12,5mg/75mg/50mg	OMBITASVIR + PARITAPREVIR + RITONAVIR	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas mâcher, casser ou dissoudre	
Vimpat 50mg	LACOSAMIDE	Comprimé pelliculé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Viread 245mg	TENOFOVIR	Comprimé pelliculé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie
Vogalene Lycoc 7,5mg (PED)	METOPIMAZINE	Comprimé orodispersible		OUI	Dispersible dans l'eau et dans la bouche, ne pas croquer	
Volibris 5mg	AMBRISENTAN	Comprimé pelliculé		NON	Ne pas couper, écraser ou mâcher	
Voltarene 50mg	DICLOFENAC	Comprimé gastro-résistant		NON	Ne pas croquer, ni mâcher	Autre AINS buvable ou suppo. Adapter la posologie
Voltarene LP 100mg	DICLOFENAC	Comprimé gastro-résistant		NON	Forme à libération prolongée. Ne pas croquer, ni écraser	Autre AINS buvable ou suppo. Adapter la posologie car non LP
Xarelto 10mg, 15mg et 20mg	RIVAROXABAN	Comprimé		OUI	ATTENTION Marge thérapeutique étroite Mélanger à de l'eau ou de la compote de pommes. Administration extemporanée	
Zamudol LP 50mg (Contramal)	TRAMADOL	Gélule à libération prolongée		OUI	Ne pas écraser les microgranules LP	Contramal solution buvable. Adapter la posologie car non LP
Zavesca 100mg	MIGLUSTAT	Gélule		NON	Tératogène et embryotoxique Manipuler avec prudence. Ne pas ouvrir, ni mâcher	
Ziagen 300mg	ABACAVIR	comprimé pelliculé		OUI	Mélanger à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide. Administration extemporanée	
Zithromax 250mg (Azithromycine)	AZITHROMYCINE	Comprimé		NON		Zithromax 40mg/ml, poudre pour susp buv

Spécialité (Libellé)	DCI	Forme galénique	Recommandations	Administration sonde entérale	Remarques / Explications	Alternative per os (sur prescription médicale)
Zolpidem 10mg (Stilnox)	ZOLPIDEM	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Principe actif photosensible. Administration extemporanée	
Zonegran 25mg, 50mg et 100mg	ZONISAMIDE	Gélule		NON		
Zopiclone 7,5mg (Imovane)	ZOPICLONE	Comprimé pelliculé sécable		OUI	Principe actif photosensible. Goût amer	
Zykadia 150mg	CERITINIB	Gélule		NON	Produit cytotoxique. Ne croquer, ouvrir ou mâcher	
Zyvoxid 600mg	LINEZOLIDE	Comprimé pelliculé		NON		Alternative Hors livret. Contacter la Pharmacie