

Règles de bonnes pratiques

COUPER, ECRASER OUVRIR, QUELS SONT LES RISQUES POTENTIELS ?

- ⇒ Erreur de dosage, sur ou sous dosage
- ⇒ Toxicité locale avec irritation ou ulcération des muqueuses
- ⇒ Modification des propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques ou pharmacologiques engendrant une toxicité, ou une perte d'effet







REGLES GENERALES

- ⇒ En l'absence de rainure sur un comprimé, la division est aléatoire et devrait être évitée
Il est préférable :
d'utiliser un autre dosage, une autre forme ou spécialité
- ⇒ Il ne faut pas couper, écraser, ouvrir les formes orales :
 - √ Gastro-résistantes (sauf pour les sondes jéjunales)
 - √ A libération modifiée (retard, LP, LM, Oros,...), les gélules LP peuvent être ouvertes mais leur contenu non écrasé
 - √ Contenant des principes actifs instables à l'air ou à la lumière
 - √ A base de substances irritantes
 - √ Contenant des principes actifs toxiques
 - √ Contenant des substances à marge thérapeutique étroite (AVK, anticonvulsivant, digoxine)
 - √ Contenant un excipient huileux (capsules)

EN PRATIQUE

- ⇒ Vérifier si le médicament ne peut être remplacé par une autre forme (liquide, sachet, cpr effervescent, dispersible, suppositoire) ou un autre médicament
- ⇒ Vérifier si le comprimé peut être écrasé ou coupé, la gélule ouverte
 - Sur le Vidal® à la rubrique posologie
 - Sur le guide d'utilisation des médicaments
 - En appelant la pharmacie
- ⇒ Pour couper un comprimé utiliser de préférence un coupe comprimé
- ⇒ L'administration après ouverture des gélules ou broyage des comprimés doit toujours se faire extemporanément pour éviter toute altération du principe actif (Les principes actifs peuvent être instables à l'air ou à la lumière)
- ⇒ Ne pas écraser plusieurs comprimés en même temps
- ⇒ Pulvériser le plus finement possible et ajouter un volume de liquide suffisant ou un aliment pour cacher un goût désagréable
- ⇒ Laver le mortier ou le broyeur après chaque utilisation
- ⇒ Bien rincer la sonde de nutrition entérale après chaque administration du médicament

Légende

	Dissolution possible dans de l'eau
	Ne pas ouvrir les capsules
	Ne pas ouvrir les gélules
	Ouverture possible des gélules
	Ne pas écraser les comprimés
	Ecrasement possible des comprimés

Diffusion non contrôlée - La version informatique fait foi